

Solidago compositum ad us. vet.

Homöopathisches Arzneimittel

Für Tiere

Hund, Katze, Kleinnager, Ziervogel

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Solidago virgaurea Dil. D4 22 mg; Berberis vulgaris Dil. D4 22 mg; Vesica urinaria suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42a) 22 mg; Pyelon suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a) 22 mg; Ureter suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a) 22 mg; Urethra suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a) 22 mg; Terebinthina laricina Dil. D6 22 mg; Hydrargyrum bichloratum Dil. D8 22 mg; Acidum arsenicosum Dil. D12 22 mg; Cuprum sulfuricum Dil. D6 22 mg; Bucco (HAB 34) Dil. D8 (HAB, Vorschrift 4a) 22 mg; Hepar sulfuris Dil. D10 22 mg; Capsicum annuum Dil. D6 22 mg; Orthosiphon aristatus e foliis sicc. Dil. D6 (HAB, Vorschrift 4a) 22 mg; Equisetum hiemale (HAB 34) Dil. D4 (HAB, Vorschrift 2a) 22 mg; Pareira brava (HAB 34) Dil. D6 (HAB, Vorschrift 4a) 22 mg; Lytta vesicatoria Dil. D6 22 mg; Apisinum Dil. D8 22 mg; Baptisia (HAB 34) Dil. D4 (HAB, Vorschrift 3a) 22 mg; Natrium pyruvicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a) 22 mg; Smilax Dil. D6 22 mg; Argentum nitricum Dil. D6 22 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen. Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.

Flüssige Verdünnung zur Injektion. 10, 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden

Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-690

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren: Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Der subkutanen Applikation ist der Vorzug zu geben, intramuskuläre und intravenöse Injektionen sind aufgrund der damit verbundenen Risiken nur in Notfällen durchzuführen. Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

-Heel

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation: Zur Verträglichkeit von Solidago compositum ad us. vet. bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen: Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn Solidago compositum ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Entsprechend der Tierart beträgt die Einzeldosis:

Großer Hund	3-4 ml	Welpen	0,5-1 ml
Mittlerer Hund	2 ml	Kleinnager	0,5 ml
Kleiner Hund, Katze	1-2 ml	Ziervogel	0,1-0,5 ml


Bei akuten Beschwerden ist je nach Schwere des Falles die angeführte Dosis bis zu 2mal täglich für bis zu 2 Wochen zu wiederholen. Bei Rezidivneigung oder chronischen Erkrankungen kann zur Langzeitbehandlung die Einzeldosis jeweils 2 mal wöchentlich verabreicht werden. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel nicht ohne tierärztliche Rücksprache über einen längeren Zeitraum gegeben werden. Die Verabreichung des Arzneimittels sollte nicht länger erfolgen als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

Wartezeit: Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Nebenwirkungen: Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.


Besondere Lagerungshinweise: Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Nicht über 30 °C lagern. Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen. Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

Stand der Information: 04/2006



Farbiger Punkt nach oben!

Im Ampullenspiß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.



Farbiger Punkt nach oben!

Ampullenspiß nach hinten ziehend abbrechen.