

Euminz® LI 170

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wirkstoff:

Pfefferminzöl

Zusammensetzung:

10 ml Lösung enthalten:

- arzneilich wirksamer Bestandteil: Pfefferminzöl (Menthae piperitae aetheroleum) 0,81 g
 - andere Bestandteile: Ethanol
-

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackungen zu 10 ml Lösung (N1) Klinikpackung mit 100 ml Lösung (10x 10 ml Lösung)

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Pflanzliches Arzneimittel zur äußerlichen Behandlung von Kopfschmerzen

Pharmazeutischer Unternehmer:

Lichtwer Pharma AG, Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlin, e-mail: Info@lichtwer.de
Kostenloses Servicetelefon: 0800-1014346 (Mo-Fr.: 9.00-13.00 Uhr)
www.euminz.de

Anwendungsgebiete:

Zur äußerlichen Anwendung bei leichten und mittelschweren Kopfschmerzen vom Spannungstyp.

Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die ärztlicher Abklärung bedürfen.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Euminz® nicht anwenden? Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit oder bekannter Allergie gegen Pfefferminzöl. Was ist bei Kindern zu berücksichtigen? Bei Säuglingen und Kleinkindern soll Euminz® nicht angewendet werden, da beim Einatmen der Dämpfe asthmaähnliche Zustände auftreten können.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Euminz® nicht auf Schleimhäute oder verletzte Haut auftragen. Nicht in die Augen bringen. Bei Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten sollte mit reichlich lauwarmem Wasser gespült werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Euminz® oder werden selbst in ihrer Wirkung durch Euminz® beeinflusst? Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Euminz® nicht anders verordnet hat. Wann und wie sollten Sie Euminz® anwenden? Soweit nicht anders verordnet, Euminz® bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren mit Hilfe des Applikators gleichmäßig auf Stirn und Schläfen auftragen. Wie oft sollten Sie Euminz® anwenden? Der Vorgang des Auftragens kann bei Bedarf mehrmals im Abstand von jeweils 15 Minuten wiederholt werden. Ob die mehr als 3-malige Anwendung das Schmerzgeschehen beeinflusst, wurde bisher nicht untersucht. Tritt innerhalb von 2 Stunden nach Beginn des Auftragens keine Besserung ein, sollte die Behandlung abgebrochen werden. Wie lange sollten Sie Euminz® anwenden? Euminz® kann auch bei häufig auftretendem Spannungskopfschmerz angewendet werden. Der Hinweis unter "Anwendungsgebiete" ist zu beachten.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn Euminz® in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigt oder versehentlich)? Eine Überdosierung ist aufgrund der vorgesehenen Applikation nicht zu erwarten.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Euminz® auftreten? Bei empfindlichen Personen können Brennen und Rötungen der Haut auftreten, die nach gründlichem Abspülen mit Wasser abklingen. In seltenen Fällen kann Pfefferminzöl auch allergische Hautreaktionen hervorrufen. In diesen Fällen ist die Behandlung abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

Achten sie stets darauf, dass Sie Euminz® so aufbewahren, dass sie für Kinder nicht zu erreichen sind!

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Falflasche aufgedruckt. Verwenden sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information:

Juni 2003

Apothekenpflichtig; Zulassungsnummer: 39162.00.00

Lagerung:

Nicht über 25°C lagern.

Diese Seite finden Sie unter: <http://www.lichtwer.de>

